

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

protiokonazol - 160 g/l
(związek z grupy triazoli)

spiroksamina - 300 g/l
(związek z grupy ketoamin)



**PSZENICA
OZIMA
I JARA**



**JĘCZMIEN
OZIMY
I JARY**

- + kompleksowe, gotowe rozwiązanie do T1, zapewniające zwalczanie wszystkich podstawowych chorób w tym terminie
- + najnowszy triazol na rynku z widocznym efektem zieloności
- + możliwość stosowania zarówno w zbożach jarych, jak i ozimych

PROLINE MAX 460 EC

Opis działania:

Proline Max 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy

- + termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pojawienia się liścia flagowego (BBCH 30 - 47)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
 - 0,75 l/ha - w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
 - 1,0 l/ha - w okresie od fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się liścia flagowego

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

- + termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

JĘCZMIEN JARY, JĘCZMIEN OZIMY

mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza

- + termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 - 50)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.